Légende

UNITE DE PAYSAGE : EST UNE PORTION DE TERRITOIRE CARACTERISEE PAR UN MILIEU TOPOGRAPHIQUEMENT ET GEOMORPHOLOGIQUEMENT HOMOGENE ET DEFINIE PAR UN PATTERN DE TYPES GEOMORPHOLOGIQUES.

TYPE GEOMORPHOLOGIQUE : EST UNE PORTION DE TERRITOIRE CARACTERISEE PAR UN SOL HOMOGENE (DEPOT DE SURFACE) ET PAR DES CONDITIONS DE DRAINAGE

(10) NUMERO D'ORDRE DE L'UNITE DE PAYSAGE

6b - 2
b

DRAINAGE

LES CLASSES DE DRAINAGE DES SOLS (ADAPTES DE LA CLASSIFICATION CANADIENNE DE POMERLEAU, 1968)

1. Excessif (sols très secs)
2. Bon à modérément bon (sols secs à frais)
3. Imparfait à mauvais (sols très frais à humides)
4. Très mauvais (sols saturés d'eau)

PENTE

LES CLASSES DE PENTE (ADAPTES DE BARIL ET MOREAU-FORT, 1979)

PENTES SIMPLES (surface significative)	PENTES MULTIPLES (surfaces significatives)	PENTE (%)
A- Pentes nulles	a- Unité faiblement ondulée	0-5
B- Pentes faibles	b- Unité fortement ondulée	5-10
C- Pentes modérées	c- Unité faiblement collinéenne	10-15
D- Pentes fortes	d- Unité fortement collinéenne	15-30

DEPOTS DE SURFACE

1.3 Les dépôts fluviatiles

3a: Fluviatile récent: sédiments fluviatiles de lits majeurs, sables et limons, de texture variable; graviers, sables et limons, en alluvions, en bancs, en terrasses, en cônes de déjection. Le dépôt se présente sous forme de bancs irréguliers. Il correspond à la phase d'inondation actuelle.

3b: Fluviatile subnodulaire: le dépôt, assez semblable au dépôt 3a, se présente cependant sous une forme de terrasses bancs irréguliers entre la fluviatile récent et le fluvio-glaciaire.

3c: Estuarien: le dépôt constitué de graviers et de sables silicoclastiques présente une fraction limoneuse importante et des coquilles de mollusques et de bivalves. L'expression topographique est très variable allant des terrasses planes et des talus.

1.4 Les dépôts lacustres

4a: Lacustre récent: dépôts de sable et limon dans lesquels on rencontre une fraction organique parfois importante. Ce dépôt est localisé au contact des lacs actuels.

1.5 Les dépôts marins

5a: Marin: de la mer de Goldsworth, caractérisé par un faciès d'eau profonde et une absence de pierrailles.

1.6 Les dépôts littoraux

6a: Plages actuelles et la zone intertidale: le dépôt est surtout constitué de sable fin et de limon, parfois de pierrailles, parfois abondantes, de blocs glaciaires.

6b: Dépôts de haut de plage, de cordons et de flèches littorales: il se compose de sables, de graviers et de pierrailles. Le dépôt se présente sous des dépôts aux textes et bien marqués.

6b(k): Unité de sable littoral mieux lessivé et présentant un niveau accéssoire du sable moins oxydé.

1.7 Les dépôts organiques

7a Marais: Dépôt constitué de tourbe décomposé, moins oxydé et de texture moins grossière. Le dépôt se présente sous forme de bancs irréguliers (sols mal drainés, tout gorgé).

1.9 Les dépôts mixtes

9a: Dépôts généralement associés aux morainiques, les zones de contact se présentent en général de sable moyen à fin.

9b: Zones de déflation: ce sont des dépôts morainiques dont les fines ont été enlevées consécutivement au vent. Les zones de déflation se présentent sous forme de couvert végétal. Ces dépôts sont localisés dans les zones de déflation et de déflation (zones très exposées aux conditions hivernales, donc soumises à la déflation).

1.10 Les affleurements rocheux consolidés

8a: Décrépie la succession rocheux sédimentaire à ou au sous quelques rares zones où le socle rocheux est recouvert par des dépôts de l'activité de la roche en place) ou organique.

8b: Décrépie la combinaison d'affleurements rocheux et de dépôts morainiques. Ce dépôt se présente sous formes de drumlins formant un micro-relief très accidenté. Ce dépôt est localisé surtout en Haute-Côte.

8c, 8c, 8d, 8e: Décrépie les combinaisons d'affleurements rocheux et/ou/et/ou. Ce dépôt se présente sous des formes quelle que soient leur origine géologique. Ces dépôts affrent aussi un microrelief très accentué.

8f: Décrépie la combinaison d'affleurements rocheux et de dépôts organiques. Ce dépôt se présente sous formes de tourbières. Le relief est assez accentué.

1.11 Les dépôts inconnus

Une très faible partie du territoire concernant par l'inventaire du continuum n'a pu être caractérisée faute de données sur un socle rocheux sédimentaire (Silurien) et/ou/et/ou/et/ou/