

# ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE RÉAMÉNAGEMENT DES ROUTES 132-197 SAINT-MAJORIQUE

CANQ  
TR  
GF  
PR  
193

## INVENTAIRE DU MILIEU BIOPHYSIQUE

### MILIEU TERRESTRE

- Forêt mixte
- Conifère
- Feuille
- Aulnaie
- Coupe totale
- Friche
- Tourbière
- Escarpelement rocheux

### MILIEU AQUATIQUE

- Marais salé intertidal
  - ① Sa<sup>4</sup>, Spa<sup>2</sup>, Sp<sup>1</sup>, E<sup>1</sup>, Pa<sup>1</sup>, Jb<sup>1</sup>, Tm<sup>1</sup>, Sm<sup>1</sup>
  - ② Sa<sup>5</sup>, Spa<sup>1</sup>, Tm<sup>1</sup>
  - ③ Sa<sup>3</sup>, Spa<sup>2</sup>, Spe<sup>1</sup>, Jb<sup>1</sup>
  - ④ Sa<sup>3</sup>, Spa<sup>2</sup>, Spe<sup>2</sup>, Jb<sup>1</sup>
- Jb : Juncus balticus  
Pa : Potentilla anserina  
E : Eleocharis sp  
Spa : Spartina patens  
Spe : Spartina pectinata  
Sa : Spartina alterniflora  
Tm : Triglochin maritima  
Sm : Scirpus maritimus

- Code de Braun-Blanquet
- 1) 1 à 5%
  - 2) 6 à 25%
  - 3) 26 à 50%
  - 4) 51 à 75%
  - 5) > 75%

- M<sub>1</sub> Mares occupant de 3 à 20% de la superficie
- M<sub>2</sub> Mares occupant de 21 à 40% de la superficie

### Végétation submergée

- Superficie inventoriée
- Zm Zostera marina
- Rm Ruppia maritima
- Sable

### SAUVAGINE

- Utilisation du territoire par les canards
  - ▲ Forte
  - ▲ Moyenne
  - ▲ Faible
- Utilisation du territoire par les bernaches (bernache du Canada et/ou bernache cravant)
  - ▲ Forte
  - ▲ Moyenne
  - ▲ Faible
- ..... Aire d'alimentation et de repos migratoire pour la sauvagine
- Zone potentielle de frai reconnue pour le capelan (Mallotus villosus)

